

Über
das Epithelium der Blase.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der medicinischen Doctorwürde

welche

nebst beigefügten Thesen mit Zustimmung der hochlöblichen
medicinischen Facultät der Universität Greifswald

öffentlich vertheidigen wird

am 10. August 1867

KARL PLATEN
aus Stralsund.

STRALSUND.

DRUCK VON WILH. DITTMER,
1867.

General Information

BY JULIUS BUDGE

THE AUTHOR

UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO



Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn

Dr. JULIUS BUDGE

Professor der Anatomie und Physiologie d. z. Rector der Universität
Greifswald

als Zeichen

innigsten Dankes

gewidmet

vom

Verfasser.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die eigenthümliche Bildung, welche das Epithelium der ableitenden Harnwege in den sogenannten Uebergangsformen zeigt, und die Schwierigkeit, welche die Erklärung der Bedeutung dieser Zellen darbietet, veranlassten mich genauere Untersuchungen hierüber anzustellen. War Anfangs auch der alleinige Zweck meiner Arbeit, mir eine möglichst klare Anschauung der vorliegenden Verhältnisse zu erwerben, so traten doch, wie es leicht erklärlich ist, allmählig einzelne streitige Punkte in den Vordergrund. Vor Allem nahm ihrer Wichtigkeit wegen die Frage: welche der beiden über die Entstehung des Epithels aufgestellten Theorien wohl für die ableitenden Harnwege die annehmlichste und wahrscheinlichste sei, mein Interesse in Anspruch, da trotz der grossen Fortschritte in der Entwicklungsgeschichte ein allseitig befriedigender Abschluss über die Entstehung des Epithels überhaupt noch nicht erreicht ist; namentlich ob man das Epithel als Produkt der Schleimhaut, oder als ein von derselben vollständig unabhängiges Gebilde zu betrachten habe. Die früher von mehreren aufgestellte Ansicht, nach welcher die intermediäre Haut als Bildungsstätte des Epithels anzusehen ist, hat,

wie es scheint durch die Resultate neuer Forschungen dass Zellen nur aus Zellen entstehen, an Wahrscheinlichkeit verloren. Als den Untersuchungen zu Grunde legendes Material wählte ich die Blase, als Repräsentant des Typus der ableitenden Harnwege, um sowohl durch wiederholte Untersuchungen an einem Objecte, als auch durch grössere Mannigfaltigkeit desselben, in so fern ich Blasen verschiedener Thiere und des Menschen prüfen konnte, möglichst genaue Resultate zu erzielen.

Special - Arbeiten über das Epithel der ableitenden Harnwege sind wenige vorhanden; mir sind nur zwei ausführlichere Abhandlungen zu Gesichte gekommen: von G. Burckhardt¹⁾ und Linck.²⁾ Auf diese beiden näher einzugehen kann ich nicht umhin, da dieselben eines Theils ausführliche Beobachtungen über das Epithel der ableitenden Harnwege enthalten, anderen Theils nicht allein unter einander in ihren Beobachtungen bedeutend abweichen sondern auch mit den meinigen sehr häufig nicht übereinstimmen.

Anatomisch mikroskopischer Befund.

Burckhardt nimmt 3 Schichten von Epithel an, die er folgendermassen charakterisirt: Die oberste der Organhöhle zugekehrte Schicht besteht aus 4 — 6 Zellenlagen, die nach der Gestalt wieder in eine obere und untere zerlegt werden muss. Die Zellen der oberen Lage

¹⁾ Das Epithelium der ableitenden Harnwege von Burckhardt Virchow's Archiv 1859. Bd. XVII.

²⁾ Ueber das Epithel der harnleitenden Wege von Dr. Linck Reichert's Archiv 1864.

und rundlich, vielseitig oblong, die der unteren mehr oder weniger eckig; ausserdem aber zeigt die letztere Lage die eigenthümlichkeit, dass ihre der unteren Epithelschicht zugekehrte Fläche Einbuchtungen zur Aufnahme der an sie stossenden Zellen-Enden hat; es zeigen ferner diese Zellen von der Seite gesehen bald längere bald kürzere Zacken, die von der Fläche den Anblick vorspringender leisten darbieten. Die grössere Zellenzahl enthält nur einen Kern, ausserdem einen helleren oder dunkleren körnigen Inhalt. Die zweite Schicht, gekennzeichnet durch eine Menge wunderlich geformter Zellen, stösst einerseits an die Schleimhaut, andererseits an die tiefsten Lagen der Platten, von welchen letzteren sie sich dadurch unterscheidet, dass ihre grössten Zellendurchmesser senkrecht zur Schleimhaut stehen. Die Formen der einzelnen Zellen sind rundlich, walzen- oder spindelförmig, cylindrisch etc. Die runden Zellen sind klein, hell und mit verhältnissmässig grossem Kern, sie sind die am wenigsten zahlreichen und kommen nur in den tiefsten Lagen vor. An sie schliessen sich ovale Zellen, welche zwischen den vorerwähnten eingestreut liegen, grösser sind und desshalb über sie hervorragen; an diese wieder die mehr oder minder zahlreichen ausgezogenen Zellen, welche sich am ehesten unter dem Namen geschwänzte Zellen zusammenfassen lassen. Der Kern ist meistens ein einfacher, je nach seiner Lage modificirt sich die Form der Zellenmembran. Das spitze Ende der geschwänzten Zellen endet meistens mit einer schwächeren oder stärkeren Anschwellung einer knopfartigen Verdickung, in der nicht selten ein helles Körnchen liegt, oft läuft die Zelle einfach spitz zu.

In Betreff der dritten Schicht bemerkt Burckhardt folgendes: der oberste Theil eines Schleimhaut-Durchschnittes zeichnet sich dunkler von den tiefern ab; er ist weniger durchsichtig und besteht aus feinen kurzen Fasern. Dieses Bindegewebe schliesst eine Anzahl von Zellen ein, die rundlich und oval geformt sind. Sie liegen gewöhnlich zu drei bis vier Lagen übereinander, ein wenig getrennt durch dieses kurzfasrige Bindegewebe, in regelmässiger Anordnung. In hellen Bildern sind sie deutlich als geschlossene Zellen zu erkennen, die unter sich in keine Verbindung stehen. Ein Zelleninhalt ist in den unteren Lagen nicht sichtbar, nur ein grosser Kern, der die Zelle beinahe ausfüllt; in den höheren umgibt ihn eine geringe feinkörnige Inhaltsmasse. In dieser Schicht scheinen viele von den geschwänzten Zellen zu haften. Die Begränzung dieser Schicht gegen die Schleimhaut zeichnet sich im mikroskopischen Bilde als ein plötzliches Hellerwerden der eigentlichen mucosa ab; die Bindegewebszellen sind deutlich als längliche und spindelförmige zu erkennen, sie liegen viel sparsamer, unregelmässiger zerstreut, ihre Grösse aber und ihr Verhalten gegen Reagentien sind übereinstimmend, erstere am vollkommensten in der Nähe der eben beschriebenen Schicht. Eine Basalmembran hat Burckhardt weder an frischen noch an mit Reagentien behandelten Präparaten gesehen.

Linck hingegen erhält durch seine Beobachtung der vorigen vollständig entgegengesetzte Resultate, und stellt durch dieselben bestimmt eine in Betreff der Genese und Bedeutung der Epithelialzelle neue Theorie auf, wenn auch, wie mir scheint, nicht sehr wahrscheinlich.

och der Beachtung werth ist. Linck kommt nämlich u folgenden Resultaten. 3 Schichten sind zu unterscheiden 1., die obere, nur aus einer Lage Pflaster- (an ihrer unteren Fläche mit Alveolen versehener) Zellen bestehend 2., die mittlere von konischen und spindelförmigen sich in einander schiebenden Zellen 3., die untere mit rundlichen oder polygonalen Zellen. Die Zellen des Epithels der harnleitenden Wege stehen nirgends in einem continuirlichen Zusammenhang mit den histologischen Gebilden des Substrats, auch nicht mit der Bindesubstanz. Das bindegewebige Stroma des Substrats wird an frischen, nicht verletzten Präparaten durch eine deutlich nachweisbare, glashelle Hornschicht vom Epithel geschieden. Von den 3 Epithel-Schichten stellt die unterste das Bildungsmaterial dar. Die beiden anderen Schichten bestehen aus der Form nach so abweichenden Epithelialzellen, dass sie nicht als zeitlich verschiedene Bildungsstadien einer und derselben Epithelform angesehen werden können, sondern sie stellen histologisch verschiedene Formen dar, die sich zeitlich nach einander, sonst aber unabhängig von einander gebildet haben. Er zieht nun eine Parallele zwischen dem Bau des Maares und dem Blasen-Epithel und kommt zu dem Resultate, dass beide nach demselben Principe gebaut sind. Zu bedauern ist nur, dass die von Linck angewandte Vergrösserung für die vorliegenden Verhältnisse wohl zu gering ist (sie betrug 200 — 300) und dass die Zeichnungen zu schematisch und nicht nach der Natur angefertigt sind.

Wenn ich nun, trotz der ziemlich ausführlichen Erwähnung dieses und des Burckhardt'schen Befundes im

Laufe der Beschreibung meines mikroskopischen Befunde hin und wieder auf jene zurückkomme, so hat das seinen Grund darin, dass ohne das Gesamtbild zu zerstören meine in vielen Punkten abweichenden Beobachtungen nicht eingeschoben werden konnten; und manche derselben wegen ihrer grossen Verschiedenheit doch noch einmal speciell einander gegenübergestellt und genauer verglichen werden müssen.

Die zu meinen Forschungen benutzten Präparate sind nicht von Blasen genommen, welche durch Chromsäure und ähnlich wirkende Mittel erhärtet waren, sondern von frischen oder getrockneten; und zwar absichtlich, um jede durch Reagentien hervorgerufene Ungenauigkeit zu vermeiden. Ich kann Burckhardt nicht allein nicht beistimmen, wenn er getrocknete Blasen verwirft, ich finde vielmehr, dass man bei gehöriger Behandlung, so klare, scharfe Durchschnitte erlangt, wie man sie weder von Chromsäure Präparaten, noch von frischen Blasen herstellen kann. Dass man überhaupt einen feinen nicht gezerzten oder gequetschten Querschnitt von einer frischen Blase machen kann, bezweifle ich sehr; mir wenigstens ist es mit dem schärfsten Messer niemals gelungen, einen ganz befriedigenden Querschnitt anzufertigen. Trocknet man dagegen die ganze Blase oder die abpräparirte, aufgespannte Schleimhaut bis zur Lederhärte, so erhält man mit einem Rasirmesser Schnitte, die in Glycerin gelegt durchsichtig sind. Ich habe ausserdem besonders isolirte Epithelzellen nur mit humor aqueus behandelt; jedoch nicht gefunden, dass die Verfahren anders wirkt, als wenn ich Wasser und Glycerin anwandte. Von Farbstoffen und Reagentien wurde

mer von mir benutzt: Anilin, Carmin, verdünnte Essigsäure, und salpetersaure Silberlösung, welche mir ausser Anilin die besten Dienste that; auch habe ich hin und wieder reine concentrirte Lösung von chromsauren Kali versucht und auch hiermit in einzelnen Fällen sehr deutliche Bilder erhalten. So viel in meinen Kräften stand, habe ich mich bemüht, Blasen verschiedener Thiere zu erhalten, leider ist die Auswahl immer nur eine geringe geblieben, da mir solche nur von: Hunden, Kaninchen, Maasen, Schweinen, Kälbern, Rindern, Schafen und Fröschen zu Gebote standen; ausserdem konnte ich noch die Blase eines achtmonatlichen menschlichen Fötus benutzen.

Der eigentlichen mucosa zunächst liegt eine von ihr durch ihre dunklere Färbung, ziemlich scharf abgegrenzte Schicht, von Burckhardt nicht mit Unrecht Matrix des Epithels genannt, die gleichsam als Uebergangsschicht zwischen Schleimhaut und Epithel eingebettet ist. Je näher die mucosa dieser Schicht rückt, um so häufiger sieht man die ovalen Bindegewebskörper der mucosa selbst rundliche Gestalt annehmen und zahlreicher werden Fig. I. a, oft sogar in der Nähe der Grenze des Epitheliums fast zu Tutzenden neben einander in den theils wellig, theils gerade verlaufenden Bindegewebszügen eingebettet liegen. Noch an der Grenze ändert sich plötzlich, das Bild, statt der zarten durchscheinenden Bindegewebszüge mit den eingebetteten Kernen, bietet sich dem Auge Fig. I. b eine dunkle auf den ersten Anblick kaum in einzelne Bestandtheile zu zerlegende Schicht dar. Dicht gedrängt sehen wir hier Körperchen an Körperchen liegen mit feinkörnigem Inhalte; oft kaum Raum für einen helleren begrenzenden

Saum zwischen sich lassend. Doch bei genauerer Betrachtung tritt der helle, fast durchsichtige und im Verhältniss zum umhüllten Körperchen schmale Saum deutlich und beständig entgegen; es gewährt das Bild gleichsam den Anblick eines aus zarten durchscheinenden Fäden gebildeten Netzes, in dessen Maschen jene Körperchen eingebettet liegen. Der Gestalt, Färbung und Reaction nach den rundlichen Bindegewebskörperchen ähnlich, die man an der Grenze der mucosa und dieser Schicht erblickt, bilden diese Körperchen 3—4 Lagen übereinander in regelmässiger Anordnung und unterscheiden sich in den einzelnen nur dadurch von einander, dass die Körperchen der oberen Schicht, einen bedeutenderen helleren Saum und einen etwas grösseren Umfang Fig. I. c, als die der unteren besitzen. Burckhardt sieht sie für Zellen und kurzfaseriges Bindegewebe an, worin ich ihm nicht beistimmen kann.

Uebt man auf einen Querschnitt einen Druck aus, so geben zuerst die obersten Körperchen, dann die unteren dem Drucke nach und verschieben sich von der mucosa, aber man verrückt nicht dadurch die ganze Schicht. Treibt man es glücklich, so bleiben viele fast durchscheinende zarte Fäden, theilweise gekreuzt, theilweise schlingenförmig gebogen zurück Fig. II. b. und zwar in Zusammenhang mit der mucosa; die Körperchen aber sind isolirt, bieten dasselbe Ansehen wie früher, nur fehlt der helle Saum Fig. II. Ihre Gestalt ist rund, ein gleichmässiger, dunkel gekörnter Inhalt erfüllt sie, ihr Bau ist fest, denn sie lassen sich nicht zerdrücken. Behandelt man ferner einen Durchschnitt mit salpetersaurer Silberlösung, so färben sich alsbald die Körperchen dunkler, fast schwarz, der helle Saum um die

iben tritt deutlicher hervor. Aber nicht allein durch diese Färbung der Körperchen wird die umgebende Substanz deutlicher, sondern sie verändert sich auch selbst, indem jeder Saum haarscharfe schwarze Conturen annimmt. Verfolgen wir diese schwarz conturirten Säume bis an die Grenze der mucosa, so erscheint uns diese beim ersten Anblick nicht mehr so scharf als früher; bei genauerer Betrachtung sieht man, wie jene Säume sich in die mucosa fortsetzen, und durch die dunkleren Conturen die Deutlichkeit der Grenze verwischen.

Nach meiner Meinung sind jene Fasern nichts Anderes als Bindegewebe. Dafür spricht einmal ihre Reaction, da dieselbe durch Behandlung mit verdünnter Essigsäure durchsichtig werden, dann auch ihre Structur — sie sind nämlich matt, bandartig, oft leicht wellenförmig gekrümmt — und endlich ihr Zusammenhang mit der mucosa. Nur möchte ich es nicht wie Burckhardt kurzfasernig nennen. Kurzfasernig erscheint es nämlich in dieser Schicht, weil es sich nicht in der Längsaxe des Bindegewebes der eigentlichen mucosa, sondern senkrecht zu ihr gebildet hat, oder um mich im mikroskopischen Bilde auszudrücken, weil die Bindegewebsfasern der mucosa am Rande angelangt, sich plötzlich senkrecht zu ihrer Längsaxe in diese Schicht einschlagen, hier sich netzförmig kreuzen und so ein Maschenförmiges Gewebe bilden. In diese Maschen eingestreut liegen nun jene eigenthümlichen Körperchen, die ich, weil ich an ihnen keine Hülle habe finden können, ihrer Ähnlichkeit mit den rundlichen Bindegewebskernen und den Kernen des ausgebildeten Epithels wegen einfach Kerne nennen will. Mir scheint, dass das was Burck-

hardt für Zellenmembran gehalten hat, eben jene Bindegewebsmaschen und Schlingen gewesen sind, die sich um jeden Kern anlegen.

Auf diese Schicht näher gegen die Oberfläche der Blase zu folgt jene, der Schleimhaut der abführenden Harnwege, eigenthümliche Epithelialschicht, welche Zellen der wunderlichsten, aber doch nach einem Typus gebaute Form enthält. Es wäre überflüssig, hier alle die verschiedenen Namen aufzuzählen, mit denen man jene Formen bezeichnet hat. Nur die Benennung Burckhardt's für eine bestimmte Anzahl von Zellen dieser Schicht nämlich geschwänzte Zellen. möchte ich adoptiren, nicht aber nur für einige Zellen sondern für die ganze Schicht, und dies deshalb: Schicht der geschwänzten Zellen nennen. Der Typus dieser Zellen ist nämlich überall der gleiche Fig. I. c die Zellen sind am einen Ende mehr oder weniger verdickt und laufen am andern spitz aus, nur mit dem Unterschied dass in den oberen Lagen, die Zellen grösser sind und ihr Uebergang in den Fortsatz mehr markirt ist, als in jenen der tieferen, wo eine eiförmige allmählig sich zuspitzende Gestalt vorwaltend ist. Dies ist jedoch nicht der alleinige Grund, die ganze Schicht, geschwänzte Zellen-Schicht zu nennen; oder vielmehr, dies wäre kein Grund jenen Namen für die ganze Schicht zu wählen.

Betrachtet man das mikroskopische Bild eines Querschnittes recht genau, so wird sich folgender Anblick darbieten: Aus der hellen Bindegewebsmasse, welche je zwei Kerne von einander trennt, sehen wir Fig. I. c einen ähnlichen hellen Streifen senkrecht in die Höhe steigen, allmählig zu einer länglich ovalen Form ausgebreitet und in seine

inern einen Kern tragend erscheinen; solche Zellen sind in regelmässiger Anordnung aus der Kernschicht neben einander gleichsam hervorgewachsen. Doch auch der Raum zwischen je zwei dieser Zellen ist wieder durch einen hellen Streifen ausgefüllt, der, sobald er das Niveau jener erreicht hat, wieder ausgebreitet und zu einer Zelle mit Kern umgewandelt erscheint; nur dass diese letzteren Zellen bedeutend grösser, als jene ersteren sind, und nach unten eine deutlichere Abschnürung gegen den hellen Streifen zeigen. Es stellt sich zunächst die Frage, welche Bedeutung jene hellen Streifen haben, in welche die unteren Enden der Zellen auslaufen, und ob die Zellen, wie es scheint, mit denselben wirklich in Zusammenhang stehen. Wenn man einen ziemlich starken Druck auf das Deckgläschen ausübt, so wird die Mehrzahl der Zellen aus ihrem Verbande gelöst; auch die Kernschicht ist grösstentheils gesprengt; nur wenige jener langen Zellen sind an ihrer Stelle geblieben; aber diese wenigen sind geeignet, um uns die Bedeutung des hellen Streifens zu erklären.

Wenn wir zuerst die einzeln herumschwimmenden Zellen betrachten, so sehen wir sie aus Kernen und einer sie umgebenden Masse zusammengesetzt (Fig. III. a.) erstere in Kernen der unteren Schicht ganz ähnlich, letztere hell durchscheinend, kaum eine merkliche Schattirung darbietend; das breitere, obere Ende zeigt eine grössere oder geringere Abrundung, das untere spitze erscheint nicht abgerundet und geschlossen, sondern zackig und zerrissen; oft wie einfach schief abgeschnitten, oft lappenförmig zerquetscht. Häufig sieht man eine gabliche Theilung des Fortsatzes (woher das rührt, davon später). Selten erscheinen zwei

Kerne in den Zellen, und auch, wo dies vorhanden, glaube ich es auf eine Täuschung zurückführen zu müssen, indem theils sich zwei Zellen durch Umschlingung ihrer Fortsätze so eng an einander legen, dass sie das Bild einer einzigen grösseren darbieten, theils sich ein freier Kern auf einer durchscheinenden Umhüllung eines anderen auflagert und so das Bild einer doppelkernigen Zelle hervorruft. In den Zellen, welche nicht aus ihrer Lage gerückt aber mehr isolirt sind, beobachtet man, dass ihr unteres Ende sich deutlich in den hellen Saum fortsetzt, der hier, wo noch Kerne der unteren Schicht vorhanden sind, mit dem saum umgebenden Bindegewebe in Verbindung zu stehen. Fig. III. b, dort wo diese fehlen, direkt sich im Gewebe der mucosa zu verlieren scheint. Dass dies wirklich sich so verhält und nicht auf Täuschung beruht, welche dadurch veranlasst werden könnte, weil der Fortsatz zu zart, zu fein und durchscheinend ist, wird klar, wenn man sich der salpetersauren Silberlösung bedient. Ich habe dazu eine Lösung 5: 100 aqua dest. gebraucht und das Präparat sofort nach der Einwirkung im Sonnenlichte beobachtet. Dann sieht man deutlich die scharfen schwarzen Conturen sich gleichsam nach einander hervorheben und die Fortsätze sich direct in die mucosa senken, oder mit dem netzförmigen Gebilde der Kernschicht in Verbindung treten. Wenn Burckhardt meint, dass die Fortsätze in der Matrix wurzelten, scheint mir diese Annahme darin begründet, dass es ihm nicht gelungen ist, diese zu isoliren, um ihren Verlauf genauer verfolgen zu können, und die Angabe einer knopfförmigen Endigung erkläre ich mir so, dass er eine Zelle gesehen hat, deren Fortsatz mit einer Schlinge um

n dazu gehörigen Kerne aus der unteren Schicht in Verbindung stand. Leicht ist auch daraus zu erklären, weshalb es ihm auffällt, dass einzelne Fortsätze das halbe Feld durchmessen können; es kommt nämlich vor, dass einzelne Fortsätze von dem mit ihnen in Verbindung stehenden Bindegewebe der mucosa nicht abreißen, und nachdem sich die zugehörige Bindegewebsfaser aus der mucosa gelöst, der Fortsatz jene bedeutende Länge besitzt. Über den direkten Zusammenhang der Fortsätze mit der mucosa bewahre ich ein Präparat Fig. 4, das mit einer Hartnack'schen Immersionslinse geprüft ist, und unzweifelhaft den Zusammenhang der Bindegewebsfaser mit den Fortsätzen darthut. Ich habe dieses Präparat von einer Blaschke erhalten, die auf dem Objectglase mit der Schleimhaut nach oben ausgebreitet, einem gelinden Drucke ausgesetzt wurde, um eine Verschiebung des Epithels von der Schleimhaut ohne Zerreißung des Fadens zu Stande zu bringen. Selten allerdings gelingt die beabsichtigte Herstellung, denn der Faden ist ungeheuer fein; der glückliche Zufall verhilft rascher zum Ziel.

In Betreff der Zellenmembran nun und des Zelleninhaltes ist es mir bei genauer Beobachtung und starker Vergrößerung niemals gelungen, solche zu unterscheiden, die durch Reagentien deutlich zu machen; auch habe ich niemals, selbst wenn Stückchen von der Epithelzelle abgenommen waren, einen Inhalt abfließen, sondern stets den Kern von einer homogenen festen Masse umgeben gesehen. Obte ich einen stärkeren besonders reibenden Druck auf das Präparat aus, so entstand allerdings aus der Umhüllung des Kernes eine dem ersten Anblick nach feinkörnige Masse,

in der jedoch weder Fetzen von Zellenmembran noch Körnchen zu entdecken waren, die aber stets bei stärkerer Vergrößerung, sich in schwach conturirte längliche Rudimente von Bindegewebe auflöste. Früher schon war mir aufgefallen, dass die Epithelien sowohl isolirt als auch bei Durchschnitten mit salpetersaurer Silberlösung behandelt, dunkler werden, ein feingestreiftes deutlich conturirtes Ansehen bekommen, und der Kern undeutlicher wurde. Ich versuchte nun an isolirten Epithelzellen mir ein deutliches Bild von der Zusammensetzung der Umhüllung der Kerne dadurch zu verschaffen, dass ich das Präparat einem öfter wiederholten gelinden Druck, um die Hüllen nicht zu zerreiben aussetzte Fig. 5, und es gelang mir nicht nur bei Präparaten mit salpetersaurer Silberlösung, sondern auch allen mit Anilin behandelten, die Hüllenelemente so zu verschoben, dass der Kern austrat und ein Bündel von Fasern knäuel förmig denselben umhüllend deutlich wurde. In den besten Präparate erhielt ich durch folgende Behandlung. Von der Blasenschleimhaut abgeschabte Epithelien wurden mit einem Tropfen Anilin und Glycerin befeuchtet und mit einem Deckgläschen bedeckt und mussten so einige Stunden stehen; dann wurde das Präparat einem senkrechten auf das Deckgläschen wirkenden kurzen aber rasch hintereinander wohl 20—30 mal wiederholten Drucke ausgesetzt, so dass es den Eindruck machte, als ob das Präparat einige Augenblicke percutirt wurde.

Diese wellenförmig verlaufenden blassen Fasern werden durch Essigsäure durchsichtig und scheinen mir auch für Bindegewebe gehalten werden zu müssen, womit denn auch die alte Beobachtung übereinstimmt, dass bei Epithel-

len der Kern durch Essigsäure deutlicher wird; indem die Sache nur so umzudrehen ist, dass der Kern nicht direkt, sondern indirekt deutlicher wird, indem Essigsäure die Hülle, die aus Bindegewebe besteht, durchsichtiger macht. Das man in den Epithelzellen einen körnigen Inhalt zu sehen glaubt, erklärt sich dann so, dass das Bindegewebe, da das Epithel ein Körper ist, nicht in einer Fläche dargestellt werden kann und folglich abwechselnd heller oder dunkler im mikroskopischen Bilde erscheinen muss. Es stände mithin der Fortsatz des Epithels nicht bloß mit dem Bindegewebe der mucosa im Zusammenhang, sondern der Fortsatz wäre eben nur ein Fortsatz des Bindegewebes, der den Epithelkörper knäueelförmig umhüllt. Auch die obige Theilung des Fortsatzes wäre dann leicht zu erklären, indem die beiden Knäuel-Enden, die den Fortsatz bilden und für gewöhnlich fest an einander haftend zusammen liegen, sich durch Druck von einander gelöst hätten. Es bestände also hiernach jede Epithelzelle aus einer Bindegewebshülle und einem Kern; und wir hätten bei dieser zweiten Schicht dasselbe Resultat, wie bei der ersten; und wir finden wie ich gleich in Bezug hierauf mittheilen will, dasselbe auch bei der dritten, obersten Schicht, zu unserer Betrachtung ich jetzt übergehe.

Die oberste Schicht besteht, wie schon Burekhardt bemerkt, aus zwei Abtheilungen, deren jede mit geringen Abweichungen aber nur eine Lage einnimmt; Burekhardt nimmt bei jeder Abtheilung deren 2 — 3 an. Die untere Lage besteht fast durchschnittlich aus mehr oder weniger eckigen Zellen, die mit ihren am Meisten abgerundeten Kanten an die oberste Lage stossen, mit ihren

am Wenigsten regelmässig gebauten an die oberen Epithelien der zweiten Schicht. Diese unteren Kanten bieten wiederum eine grosse Eigenthümlichkeit, indem an einer Stelle des Epithelialkörpers die Hülle spitzig Fig. I. ausgezogen ist, also halbe Bogen mit dem Körper nach jeder Seite hin bildet; legen sich nun mehrere Epithelialkörper in einer Reihe neben einander, so entstehen natürliche Nischen und Vorsprünge, die abwechselnd von den oberen Enden der Epithelien der zweiten Schicht ausgefüllt werden. Die obere Lage der obersten Schicht Fig. I. wird von wirklichen Pflasterzellen gebildet, die von ovaler Gestalt mit ihrem längsten Durchmesser auf den unteren ruhen, ziemlich gross sind, und fast immer nur einen häufig sehr grossen Kern besitzen. Auch hier lässt sich die Hülle leicht auf die früher erwähnte Weise in Bindegewebe zerlegen; Der Kern tritt durch die auseinander geschobenen Bindegewebsfasern aus und ein Knäuel von Bindegewebe bleibt zurück. Niemals auch nicht bei den feinsten Durchschnitten habe ich eine Spur von Basalmembran gefunden; und da Linck der Erste und Einzige gewesen ist, der sie gesehen hat, so glaube ich die Existenz derselben noch bezweifeln zu müssen, zumal eben wie ich oben bemerkte, die von demselben angewandte Vergrösserung für die Feinheit der Präparate nicht ausreicht und nicht absolute Sicherheit gewährt.

Genese und Wachsthum des Epitheliums.

Die angeführten Untersuchungen führen nun, wie scheint, zunächst zum Schlusse, dass das Epithelium der Harnblase entstehe und sich ergänze aus der Schleimhaut selbst.

Diese Annahme widerspricht indessen den vortrefflichen auf
 ihre lange Arbeiten gestützten Beobachtungen, welche von
 Remak ¹⁾ gemacht sind und jetzt allgemein in der Wissen-
 schaft gelten. Dieser Forscher hat nämlich gefunden, dass
 das Epithelium unabhängig von seinen Substraten entstehe,
 und an dieselben nur anlege, jedes näheren Zusammen-
 hanges mit demselben jedoch entbehre. Die in Bezug auf
 das Epithel und die zunächst darunter liegenden Schichten
 im demselben beobachteten Entwicklungsvorgänge sind
 folgende: Drei Keimblätter finden sich in der Keimscheibe,
 das oberes, mittlere und unteres oder Drüsenblatt, von denen
 das letztere sich erst nach der Bebrütung resp. nach der
 Befruchtung aus dem mittleren durch Theilung entwickelt.
 Die histologischen Elemente des Embryo vertheilen sich
 nun so auf diese drei Keimblätter, dass aus den centralen
 Theilen des oberen und mittleren, die mit einander ver-
 schmelzen, aus jenem das Centralnervensystem aus diesem
 der Urwirbel und die Chorda entstehen; während aus den
 peripherischen Theilen des oberen die Epidermis mit den
 epidermoidalgebilden, aus den peripherischen des mittleren
 die Muskeln, Knochen, Bindegewebe, elastisches Gewebe, Knor-
 ren und die peripherischen Nerven hervorgehen. Das Drü-
 senblatt dagegen liefert nur das Epithelium der Luftwege
 des Darmtractus und das Parenchym der Anhangsdrüsen.
 Der centrale Theil sowohl als auch der peripherische schlies-
 sen sich nun zu je einem Kanal und zwar einem hinteren
 kleineren und vorderen grösseren, von denen der erste das
 centrale Nervensystem umschliesst, während dieser die

¹⁾ Remak: Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbel-
 thiere. Berlin 1855.

Wände der Leibeshöhle bildet. Die Gefäß- und Nervenentwicklung findet sich nur in dem mittleren Keimblatt und dem centralen Theile des oberen, mit dem Unterschiede jedoch, dass in den Gefäßen des mittleren Keimblattes und Vieles früher Blutkörperchen entstehen; der periphere Theil des oberen jedoch und das ganze Darmdrüsenblatt bleiben vollständig ohne Gefäß- und Nervenbildung. Während der centrale Theil des mittleren Keimblattes mit dem centralen des oberen verwächst, bildet der periphere bei Entstehung des oben erwähnten vorderen Kanals die sogenannten Seitenplatten, aus denen durch Theilung die Hautplatten, Darmfaser-Platten und Mittelplatten hervorgehen. Von diesen interessiren uns hier nur die Darmfaserplatten, weil sie mit dem Drüsenblatte zusammen den Darm durch Abschnürung bilden und zwar so dass das mittlere Keimblatt muscularis und mucosa, das Drüsenblatt nur das Epithelium liefert. Durch Ausstülpung des Vorderdarms entstehen dann Lunge, Leber, Pankreas und Magen, während sich aus dem Hinterdarm Allantois und Urachus entwickeln, aus welchem letzteren die Blase entsteht. Zur Bildung dieser Organe liefert das Drüsenblatt nur das Epithel, wie bei Lunge und Blase oder das zellige Parenchym wie bei Leber und Pankreas. Niemand dürfte sich bei consequenter Durchführung der Remakschen Theorie aus dem oberen Keimblatte und dem Drüsenblatte Bindegewebe, niemals aus dem mittleren Epithelium entwickeln, und dies wäre für eine absolute Gültigkeit der Remakschen Lehre um so wichtiger, als die kleinsten Abweichungen von so bestimmten und verschiedenen Functionen, wie sie Remak den einzelnen Blättern

schreibt, auch die unbedingte Richtigkeit anderer Prozesse Zweifel stellen würden. Allein mehrere Gebilde wider-
 ehen dieser Theorie, wie Remak selbst beobachtet
 ; erstens nämlich die Linse; ¹⁾ hier entwickeln sich aus
 dem oberen Keimblatt Bindegewebe und Epithelium ge-
 meinschaftlich und zwar so, dass das Bindegewebe, das
 zuerst entstehende zu sein scheint. Remak erklärt diese
 Erscheinung auf folgende Weise: „Vorliegende Entwick-
 lung“, sagt er, „steht mit meiner Theorie durchaus nicht
 im Widerspruch, da das Bindegewebe der Linse keine Ge-
 fässe enthält.“ Es scheint mithin aus Remaks Theorie her-
 zuergehen dass Alles was im späteren Leben Gefässe
 , also Knochen, Muskeln, Bindegewebe u. s. w. aus dem
 mittleren Keimblatte, da dieses allein Gefässe enthält und
 es, was der Gefässe entbehrt aus dem oberen oder
 unteren Keimblatte entstehen muss. Doch auch hier finden wir
 eine Ausnahme und dies ist der zweite Punkt, der
 mir scheint, gegen Remak's Theorie spricht; die
 Gefässe nämlich entwickeln sich aus dem mittleren Keim-
 blatte (sie besitzen ja auch vasa vasorum) allein mit ih-
 rem Epithelium, welches aus demselben Blatte ihr Epithelium, welches keine
 Gefässe besitzt. Diesen Punkt übergeht Remak mit
 Stillschweigen, seine Anhänger haben ihn zu vertheidigen ge-
 sucht; doch hierauf kommen wir bei der Entwicklung des
 Epithels in Neubildungen zurück. Remak spricht also
 deshalb der Schleimhaut jede Betheiligung an der Ent-
 wicklung des Epithels ab, weil sie Gefässe hat, oder hätte
 das Epithel Gefässe so könnte es aus dem mittleren Keim-

¹⁾ S. 189. Entwicklungsgeschichte.

blatt entstehen. Gegen die Stichhaltigkeit dieser Theorie können, wie ich glaube, sofern andere Gründe für den Zusammenhang von Schleimhaut und Epithel und das Entstehen des Letzteren aus Ersterem sprächen, Zweifel erhoben werden und zwar aus zwei Gründen. Erstens nämlich beweist Nichts, dass die mucosa wenigstens der Schleimhaut zunächst gelegene Theil (die sogenannte Propria) von Anfang an mit Gefässen versehen ist, sie könnte diese sehr wohl erst durch die Verwachsung mit dem mittleren Keimblatte erhalten, und wie jede Neubildung allmählig vascularisirt werden, nachdem mucosa und Epithel schon ihre verschiedenen Charaktere angenommen hätten. zweitens dürfte aber nach Remak Epithelium, auch in seinen Entwicklungsstadien niemals Gefässe besitzen, indem es dann nicht mehr Epithelium wäre. Nun hat aber Burkhardt durch oft wiederholte, genau ausgeführte Injection nachgewiesen, dass die unterste Schichte des Epithels der ableitenden Harnwege, von feinen Blutgefässen durchzogen wird. Wenn sich dies nun bestätigt, so könnte man auch principaliter dagegen keine Einwendung machen, dass auch das Epithel sich aus dem mittleren Keimblatte wenigstens theilweise entwickelte, oder man müsste zugeben, dass das Drüsenblatt auch Bindegewebe zu produciren im Stande sei, welches später durch Verwachsung mit dem mittleren Keimblatt Gefässe erhielt. Auch weiss ich nach Remak's Theorie keine Erklärung für eine Beobachtung, die er selbst anführt, dass nämlich, nachdem sich aus dem Hindarm die Allantois ausstülpt, nach kurzer Zeit das Drüsenblatt in derselben dieselbe Stärke als das mittlere Keimblatt erreicht, was doch bei alleiniger Bedeutung des Drüsenbl

Epithel wenigstens auffallend ist. Das Remak's so arfsinnig und geistreich durchgeführte Theorie, allein herrscht und herrscht und für unantastbar gehalten wird, so lange keine bestimmten Untersuchungen über den näheren Zusammenhang von Schleimhaut und Epithel vorliegen, nicht zu verwundern, doch glaube ich, dass, wenn Beobachtungen andere Resultate ergeben, diese zu neuen Untersuchungen der Entwicklung veranlassen, und vielleicht mit Berücksichtigung der oben erwähnten Punkte eine Uebereinstimmung herbeiführen werden.

Man kann also nicht in Abrede stellen, dass manche Gründe gegen die stricte Durchführung der Remak'schen Theorie sprechen, manche ferner für die grössere Wahrscheinlichkeit einer anderen sich finden lassen. Dass meine Untersuchungen mich mehr dieser letzteren geneigt gemacht haben, ist wohl schon aus den Versuchen dieselbe soviel als möglich dem Bereiche der Unmöglichkeit und Unwahrscheinlichkeit zu entrücken oder wenigstens noch ferner Untersuchungen jener anderen vorläufig allgemein herrschenden Theorie zu erstreben, zu ersehen gewesen; die spätere Entwicklung meiner Ansichten, die ich durch Beobachtungen gewonnen habe, will ich der Erwägung, für diese Theorie sprechenden Gründe folgen lassen.

Dass Epithelium überhaupt aus Bindegewebe, also nach Remak aus dem mittleren Keimblatte entstehen kann, ist durch pathologische Neubildungen zur Evidenz erwiesen und von allen Beobachtern anerkannt. So finden wir, um einige Beispiele anzuführen, Neubildungen von Pflaster-epithelium auf Cysten-Membranen und auf Pseudomembranen seröser Häute; ferner Neubildungen von serösen Mem-

branen mit Pflaster-Epithelium, endlich Neubildungen v
Flimmerepithelium auf Ohrpolypen und auch in Cysten. N
behaupten die Anhänger der Remakschen Lehre, dass
Epithelium in Neubildungen so wie das der Gefässe v
jenem des Drüsen- und Hornblattes verschieden sei, u
zwar in so fern als es nur eine Lage und keine Drüs
bilde. Doch das Epithelium des Horn- und Drüsenblat
bildet auch nicht immer mehrere Lagen, und es ist fer
überhaupt noch nicht erwiesen, dass es in Neubildung
Drüsen bilden soll, dass dieser Ort für Drüsenbildu
geeignet ist! So viel mir bekannt, bildet es eben nur kei
ohne dass der Beweis geführt wäre, dass demselben
Bildungsfähigkeit abzusprechen ist. Ist ferner nicht j
Eiterbildung ein Beweis für die Fähigkeit des Bindegewe
Zellen zu produciren? Woher regenerirt sich das n
entzündlichen Processen vollständig allein oder mit ein
Theile der Schleimhaut abgestossene Epithel, wie
diesen Process, um nur ein Beispiel anzuführen, an d
Uterus nach der Geburt vor sich gehen sehen? Nach den U
tersuchungen von Robin¹⁾ und Colins²⁾ nämlich wird die
terste Schicht der Schleimhaut, die sich zwischen m
cularis und mucosa vom 4. Monat der Schwangersch
an bildet, nicht abgestossen nach der Geburt sond
bildet das Fundament, auf welchen sich die neue Schle
haut mit dem Epithel entwickelt. Kann sich das l
thelium nach Remak nur aus dem Drüsenblatt
wickeln, so fehlt uns hier doch jede Erklärung für
Regeneration desselben, da nur für die Entwicklung

¹⁾ Robin, Arch. générales. 1848.

²⁾ Colins, These. Paris 1847.

en Schleimhaut ein geeignetes Substrat zurückbleibt, sich also nothwendig aus ihr das neue Epithelium entwickeln muss.

Endlich sind die Untersuchungen trefflicher Beobachter, Billroth, Heidenhein und Anderer, von grösster Bedeutung, durch welche ein Zusammenhang des Epithels mit den tiefer liegenden Schichten sicher festgestellt

Billroth³⁾ beobachtete zuerst, dass die von ihm entdeckten Fortsätze der Epithelien an Froschzungen, sich in die Papillen fortsetzen, wo sie sich unter den feinen Fibrillen aus denen letztere zusammengesetzt sind, verlieren: „Die Fibrillen aber der Papillen unterscheiden sich durchaus nicht von den Bindegewebsfibrillen, aus welchen übrigens der obere Theil der Zunge zwischen den Muskeln zusammengesetzt ist, und sind wohl ohne weiteres für Bindegewebe zu halten. Es lag wohl sehr nahe, fährt er fort, daran zu denken, dass die Epithelialkleidung hier in einem höchst innigen Zusammenhang mit dem fasrigen Bindegewebe der Papille selbst stehe. Die Spindelform der Zellen wies einerseits auf die Bindegewebszellen hin, andererseits macht die ganze Anordnung der Zellen den unabweisbaren Eindruck des Hervorwachsens und der Verankerung in die Papille selbst. Es ist die Frage in wie weit der in den Fibrillen der Papille sich verlaufende Zellenstiel mit den Fibrillen selbst identisch ist, beide Fasern schwinden nach der Wirkung von Essigsäure, erhalten sich jedoch in Chromsäure und haben somit wenigstens einige chemische Verwandtschaft. Dass die tieferen Epithelialzellen nachträglich

³⁾ Billroth, Müller's Archiv 1858,

mit ihren Stielen in die Papillen hinein wachsen sollten, höchst unwahrscheinlich, da die ganze Richtung des Regenerations-Wachsthum's der Epithelialhäute von unten nach oben geht; es ist somit am natürlichsten, anzunehmen, dass die tieferen Epithelialzellen an den Stielen aus den Papillen hervorstechen und von hier aus regenerirt werden, während die oberen Lagen abgestossen sind.“

Die von Billroth in der Zunge entdeckten Ausläufer der Epithelialzellen, wurden von Heidenhain ¹⁾ auch im Darme gefunden und ebenfalls ein Zusammenhang mit der Schleimhaut und zwar den Bindegewebskörperchen beobachtet. Heidenhain spricht sich folgendermassen aus: Wenn man ein frisches Schleimhautstückchen in Hühnerweiß oder humor aqueus, die zweifelsohne die Zellen am wenigsten verändern, zerzupft und dann untersucht, so sieht man stets eine Anzahl von Zellen mit längeren und kürzeren Enden (Ausläufern) versehen. Wo letztere fehlen, kommt man bei genauerer Untersuchung zu der Ueberzeugung, dass man abgerissene Zellen vor sich hat, denn das hintere Ende der Zellen erscheint nicht scharf und von einer scharfen Contour begrenzt. „Für den Zusammenhang mit dem subepithelialen Gewebe spricht erstens die Anschwellung der Epithelialzellen-Ausläufer denn diese Anschwellung halte ich für wirkliche Zellen des subepithelialen Gewebes, zweitens geht bei Fettfütterung Fett in die Bindegewebszellen über.“

Der Heidenhainsche Befund ist bis auf den directen Zusammenhang der Ausläufer des Epitheliums mit

¹⁾ Dr. R. Heidenhain: Die Absorptionswege des Fettes in Moleculen. Untersuchungen z. Naturlehre 1858. Bd. IV.

Bindegewebskörperchen von A. Wiegandt¹⁾ bestätigt; auch hat Wiehen²⁾ sowohl im Darm als auch an den Epithelien der ableitenden Harnwege Fortsätze beobachtet; jedoch diese Zellen vermittelt der Fortsätze mit den unterliegenden Geweben zusammenhängen, darüber wage ich nicht zu entscheiden, denn so oft er sich auch bemüht hat, die Zellen im Zusammenhang mit der Schleimhaut zu erhalten, habe er in dieser Beziehung doch niemals beweisende Bilder erhalten können.

Fasse ich nun kurz die Resultate meiner Beobachtungen zusammen, indem ich noch einmal alle drei Schichten kurz auf die Wahl und Bestimmung einer der Theorien überblicke, so glaube ich die Vorgänge folgendermassen erklären zu müssen: Je mehr sich die Bindegewebskerne der mucosa der Kernschicht des Epitheliums nähern, um so mehr verändern sie ihre Gestalt, von oval in rundlich, verlieren überhaupt mehr das eigenthümliche Ansehen der Bindegewebskerne und werden häufiger. Angelangt an der Grenze, wo das Bindegewebe sich rechtwinklich zur Axe in der mucosa stellt, liegen die Kerne dicht gedrängt in einem feinen Netze von Bindegewebsfasern eingebettet, und nehmen von dort bis zur zweiten Schicht, deutlich an Grösse zu. Sie wachsen wahrscheinlich durch Nachschub und ziehen also die sie umgebenden Bindegewebsknäuel mit sich, treten frei aus der Körnerschicht als Epithelien hervor, stehen aber entweder direct oder indirect indem sie das Bindegewebe hinter sich herziehen mit der Schleim-

1) A. Wiegandt, Dorpat. dissert. 1860.

2) Wiehen, Zeitschrift für rationelle Medizin. Bd. XIV.

haut in Verbindung. Die Hüllen wachsen mit dem K, das in die Länge gezogene Bindegewebe wird feiner, v zum feinen Fortsatze des Epithelkörpers und wir ha die zweite Schicht die geschwänzte. Je mehr sich Epithelkörper der ersten Schicht nähern, um so m nehmen sie an Grösse und Ausdehnung zu, um so fei wird der Faden, durch den das Epithel mit der Schle haut in Verbindung steht, um so mehr gehen sie in Breite, plötzlich reisst der Faden, und wir haben die un Abtheilung der ersten und obersten Lage. Die klei Fortsätze, welche von dem abgerissenen Faden noch ü sind, bilden mit dem in die Breite ausgedehnten Epith körper, jene Nischen, welche zur Aufnahme der obe Enden der zweiten Schicht bestimmt sind und bedin so grossen Theils mit die Festigkeit des Epithels. End gleicht auch diese Ausbuchtung, dieser kleine Forts der allein noch an die Entstehung und den Zusamm hang des Epithels aus und mit der Schleimhaut erinne sich aus, und das in seinen früheren Stadien gar ni wieder zu erkennende Epithel tritt als einfaches Pflas Epithelium an die Oberfläche der Organhöhle. So, gla ich, erklären sich durch diese Theorie die mannigfac Eigenthümlichkeiten, des Blasonepithels, über die so gestritten, ungekünstelt und ganz natürlich und wir brauch wie mir scheint, keine Hypothesen, weder über die Forr der geschwänzten Schicht, noch über die mit Einbuchtung versehenen Epithelkörper. Entwickelte sich das Epithel als geschlossene Zellen aus der Schleimhaut nach Bur hardt, oder frei an der Oberfläche derselben nach Lin so ist doch nicht ganz leicht einzusehen, weshalb ru

len diese eigenthümliche Metamorphose durchmachen
ten, um schliesslich wieder zu der ursprünglichen Form
rückzukehren, denn der Einwand, dass Druck diese Form
vorbringe, ist doch wohl nicht recht haltbar, da ober-
unterhalb dieser Schicht, wo wahrscheinlich der Druck
derselbe ist, die rundlich ovale Gestalt vorhanden ist.
e von der Schleimhaut vollständig unabhängige Bildung
Epithels scheint mir aber (ohne hier auf die Entwickelung
zurückzukommen) nicht möglich, weil der Zusammen-
g der Epithelkörper mit dem Bindegewebe der Schleim-
t nachgewiesen; es wäre also nur noch das Vorrücken
Mitschleppen der Bindegewebsfasern zu bezweifeln.

Fände kein Vorrücken durch Nachschub statt, so
nte das Epithelium sich durch Theilung regneriren,
auch von verschiedenen Seiten ausgesprochen und
auptet worden ist. Wunderbarer Weise aber findet
höchstens $\frac{1}{2}$ Procent Epithelkörper mit doppelten
nen, deren Entstehen ich schon früher nachgewiesen
haben glaube; doch angenommen es wäre wirklich eine
e mit mehreren Kernen, so beweist dieser Befund so-
ge noch immer Nichts, so lange nicht Ein- und Ab-
törung des ganzen Epithelialkörpers und zwar nicht
nal sondern regelmässiger beobachtet ist. Ausserdem
bei dieser Beobachtung auch eine andere Täuschung
erordentlich leicht möglich, indem ein freier Kern sich
die Hülle eines anderen Kernes in die Nähe dieses
und so den Epithelialkörper als zweikernig erscheinen
t; man entgeht diesem Irrthum durch recht genaues
stellen und durch Wechseln der Oculare. Endlich
nte also noch behauptet werden, die Kerne zögen keine

Bindegewebssschlinge mit sich in die Höhe, sondern spitze Ende des Epithelialkörpers sei nur mit dem Bindegewebe der mucosa verwachsen; oder eine Zelle ziehe eine Schlinge, die mit der mucosa zusammenhänge, sich; wäre meine Behauptung richtig, so existirte weder Zellenmembran noch Zelleninhalt; und das glaube ich beweisen zu können.

Bei jedem Epithelialpräparat lässt sich bei richtiger Behandlung leicht der Beweis führen, dass die Hülle aus Bindegewebe besteht; doch Vorsicht und Ausdauer sind nöthig, da ein zu starker Druck, besonders die Zellen der ersten Abtheilung der obersten Schichte vollständig zermalmt so dass nur Kerne und feine Bruchstücke von Bindegewebsfasern übrig bleiben; bei richtiger Behandlung jedoch sieht man die ganze Zelle aus einem Knäuel von Bindegewebsfasern bestehen, die durch den Druck um ein wenig von einander gerückt sind. Doch es bedarf keiner zerstörenden Behandlung gar nicht; salpetersaure Auflöserlösung ist hinreichend bei vollständig unversehrten Epithelkörpern, die faserige Zusammensetzung derselben durch die scharfe Conturirung der einzelnen Fasern nachzuweisen Fig. VI. Eine Hauptbedingung ist jedoch, dass das Licht recht intensiv sei; ich habe mehrmals unter dem Schutze eines blauen Glases, directes Sonnenlicht benutzt und so ein prachtvolles Bild erhalten.

So möchte ich also, durch meine Beobachtungen bestätigt, mich der Theorie, die das Epithelium als Product der Schleimhaut auffasst, anschliessen, indem es mir eben scheint als ob die Bindegewebskörperchen zu den Kernen, die Bindegewebsfasern selbst zu den Hüllen der Epithelien werden.

Lebenslauf.

Karl Konstantin Platen evangelischer Religion, Sohn eines Kaufmannes bin geboren in Stralsund am 24. September 1843, woselbst ich das Gymnasium bis Quarta beendete und dann zur Realschule überging. Ein Jahr später kehrte ich zum Gymnasium zurück, blieb daselbst bis zum Jahre 1862, verliess dasselbe dann aber, um nach Berlin auf das graue Kloster zu gehen wo ich Michaelis 1863 mein Abiturienten-Examen absolvirte. In Göttingen immatrikulirt blieb ich drei Semester, besuchte dann auf ein Semester Würzburg und kam Michaelis 1865 nach Greifswald, um hier bis zum Schlusse meiner Studienjahre zu verweilen.

In den acht Semestern habe ich folgende Vorlesungen gehört:

I. In Göttingen:

Hofr. Prof. Weber: Physik.

„ „ Henle: Allgemeine und systematische Anatomie, Präparirübungen.

Prof. Meissner: Experimental-Physiologie.

Dr. Ehlers: Zeugung der Thiere.

B. In Würzburg:

Prof. Geigel: Propädeutische Klinik mit Auskultation und Perkussion.

C. In Greifswald:

Prof. Limprecht: Unorganische und Organische Chemie.

„ v. Feilitzsch: Experimental-Physik.

Dr. Jessen: Botanik.

Prof. Mosler: Specielle Pathologie und Therapeutische medicinische Klinik.

Gehr. Prof. Bardeleben: Akjurgie; allgemeine und specielle Chirurgie; Operationsübungen, chirurgische Klinik.

Prof. Pernice: Theorie der Geburtshülfe; Frauenkrankheiten, Krankheiten der Neugeborenen; geburtshülfl. Klinik.

Prof. Budge: Mikroskopisch-physiologischen Kurse.

Prof. Grohe: Pathologische Anatomie.

Prof. Laurer: Arzneimittellehre, Arzneiverordnungslehre, Verbandslehre.

Dr. Schirmer: Ophthalmoskopische Uebungen, Diagnose der Augenkrankheiten.

Dr. Häckermann: Gerichtliche Medicin.

Allen den Herren, welche mir während dieser Jahre Lehrer und Führer in der Wissenschaft gewesen sind, spreche ich meinen tiefgefühlten Dank aus und werde stets der mir von allen Seiten so oft erwiesenen Güte gedenken sein.

Thesen.



-) Die den subkutanen Injectionen oft vorgeworfene Gefährlichkeit ist nicht vorhanden.
-) Die Umwandlungen des Uterus nach der Geburt sind nicht mit der von Remak aufgestellten Entwicklungs-Theorie in Einklang zu bringen.
-) Wenn kein Missverhältniss zwischen der Grösse des Fötus und des Beckens besteht, ist bei Indikationen zur Beschleunigung der Geburt, die von Kristeller angegebene Expressio der Extractio vorzuziehen.

Gegner sind:

Herr Dr. Klockmann.

„ Dr. Körner.

„ Drd. Schlenzka,

Erklärung der Tafel.

- I. Senkrecht auf das Epithelium geführter Querschnitt von einer getrockneten Hundeblase. Vergrösserung 500.
- a. Zahlreiche Bindegewebskörperchen in der Nähe der Grenze des Epitheliums.
 - b. Kernschicht.
 - e. Obere Lage der Kernschicht.
 - d. Schicht der geschwänzten Zellen.
 - e. Heller Saum zwischen den Kernen entstehend und in die geschwänzten Zellen übergehend.
 - f. Untere Lage der obersten Schicht; die kurzen Ausläufer der Zellen dieser Schicht.
 - g. Obere Lage der obersten Schicht.
- II. Querschnitt einer getrockneten Schweinsblase 500 mal.
- a. Isolierte Kerne aus der Kernschicht.
 - b. Bindegewebe der Kernschicht, in welches die Kerne eingebettet.

Fig. III. Querschnitt wie Fig. II.

a. Isolirte Zellen der Schicht der geschwänzten Zellen.

b. Zusammenhang der Zellen dieser Schicht mit der Kernschicht und mucosa.

Fig. IV. Stückchen einer Froschblase, deren Epithelium nach oben sieht; eine Zelle aus der geschwänzten Schicht isolirt und in Zusammenhang mit der mucosa. Vergrößerung 760.

Fig. V. Epithelien aus der Blase eines achtmonatlichen Fötus, aus denen durch Druck die Kerne entfernt sind, so dass nur die Hüllen zurückgeblieben. Vergrößerung 760.

Fig. VI. Epithelien der obersten Schicht aus der Blase des Schweines mit salpetersaurer Silberlösung behandelt. Vergrößerung 500.